



EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA

ELJÁRÁSREND

Az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Csecsemő- és gyermekgyógyászat  
Tagozatának ajánlása a COVID-19 ellátásrenddel kapcsolatban

A krónikus betegségek gondozása mind az alapellátásban, mind a járóbeteg szak- és fekvőbeteg ellátásban arra a szintre csökkent, ami az életmegóvás szempontjából fenntartandó, az orvosok munkavégzése kapcsán központi javaslat lenne szükséges. Az így felszabadult kapacitásokat hogyan lehet átcsoportosítani a kórházakon belül a sürgősségi ellátás irányába, elsősorban a COVID-19 irányába, hogy ne ugyanaz a sürgősségi csoport kapja a legnagyobb valószínűséggel a vírust és a legnagyobb dózissal.

Fekvőbeteg intézeti betegút:

Sürgősségi bejáraton beérkezik a beteg, ahol kitölti a kérdőívet.

Ha a láz kérdésre az a válasz, hogy láztalan, vagy nem mértem, akkor nem érintős homlokhőmérővel a lázat mérünk.

Ha láztalan, nem COVID-19 kontakt és nincs infekciós tünete (nem hányt, nem hurutos), akkor a láztalan Ambulanciára megy

A hospitalizációt igénylő COVID-19 gyanús beteget már az infektológián vizsgáljuk, illetve vesszük le a mintát megfelelő védőfelszerelésben.

A kritikus állapotú betegek az gyermek intenzív osztályra kerülnek előzetes értesítés után.

A nem infekciós sürgősségi és nem sürgősségi esetek (pl. mérgezés, trauma, húgyúti infekció) az infektológiától elkülönült egységben kerülnek elhelyezésre.

A lázas, nem enteritises, nem légúti sürgősségi és nem sürgősségi betegek a nem lázas egységtől elkülönített egységben fekszenek, ami természetesen az infektológiától is elkülönül. (pl. lázgörcs, stomatitis, tonsillitis)

COVID-19 kérdőív

Név:.....

Születési idő:.....

TAJ:.....

Tartózkodási hely:.....

Elérhetőség (Tel, e-mail):

.....

Láz ( $\geq 38$  C)

Köhögés

Fulladás

Tünetek kezdete (év.hó.nap.): ..

A tünetek kezdetét megelőző 14 napban külföldön járt-e?  igen  nem

Került-e szoros kapcsolatba az elmúlt 14 napban új koronavírussal megerősítetten vagy valószínűsítetten fertőzött személlyel?

- egy háztartásban él;
- személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);
- zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) [pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi beteglátogatás során];
- közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl. kézfogás útján);
- védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz);
- a repülőúton
  - bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült
  - COVID-19 beteget ápolt,
  - a repülőgép személyzeteként az új koronavírussal fertőzött beteg ülőhely szektorában látott el szolgálatot,
  - amennyiben a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszhető a kontaktuskutatás;
- az előírt egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg közvetlen ellátásában/ápolásában részt vett vagy laboratóriumi dolgozóként COVID-19 beteg mintáit kezelte.

.....  
**Aláírás**

Az eljárásrend visszavonásig érvényes.

Készítette: EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium  
Csecsemő- és gyermekgyógyászat Tagozat

Budapest, 2020. március „ 21. „

Jóváhagyta:

  
Prof. Dr. Kásler Miklós  
miniszter

